duntadantadantadantad

Dona branca (du Dâo)

Vass7R03s301-305

Collection Vassal-Montpellier

1516Mtp3

Jana Granea (m. Jan)

Dona branco du Dão 7 R3 1301.305





ANNEE 1990 NOM Jona branca du Jão EMPLACEMENT 7 R3 5.301.305 289101 . De

Souche	Mbre yeux	rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraisc mi/f	Vé début	raisor mi/v	fin	Maturité
		15.3. 3,30 Mi	(+6)	20	Port :	-		16.7 +1		16.8

NOM Dona Granca du Das DEPLACENTANT F Rq 3 A 301.305

2834 = Dona Branca

151603

Southe Where Débourrement Nore Perti Floraison Véraison
début mi/déb grap lité début mi/f fin début; mi/v fin Maturité

1 1.0 29,5 1.6 3.6 fine despire

29,5 1.6 3.6 fine despire

1 1.0 29,5 1.6 3.6 fine despire

29,5 1.6 3.6 fine despire

20,5 1.6 3.6 fine despire

21.5 1.0 2000 milli

22.5 1.6 3.6 fine despire

23.5 1.6 3.6 fine despire

24.0 2000 milli

25.0 2000 milli

26.0 2000 milli

26.0 2000 milli

26.0 2000 milli

27.0 2000 milli

28.0 2000 milli

29.0 2000 milli

ANNEE 1992

NOM Dorra brunca EMPLACEMENT 7 R 3 1 301. 305 6

2891 01 1516 0 3

Dao.

1 2 23,3 26,3 0 4 18.5 21.5 26.5 22.7 27.7 30.7 M.8 2 2 16,3 19.3 1 3 2 16,3 19.3 1 4 3 19.3 26.3 0 Grappe: G - M - P Dim : 8 Compacité: I) - M - C Pour: 0 Mill:1 5 2 16,3 19.3 1 3 Baie: TG - G - M - P Dim : 17 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: (inc) - coloré Saveur: S - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: Luge Vigueur: 2,7	Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
	3	2 2 2 3 2	233 233 26,5 193 163	263 263 19.3 263 19.31	103	Crappe Pour: Baie: Couleur Saveur Pépins	18.5 21.5  -1  : G - M - P  O Mil  TG - G - M  disc-sph-el  : B-Gr-Rs- : S - m - a : avec - ap	26.5 )Dim 1 :1 - P D: 1-ov-( Rg-N r - for yrène	22.7 im 17 obov-cy Jus ox - he	27.7 +1 Compa	30,7 cité:	24,8 +2 (L) - M -C

		199	A. C.	(3°)					
NOM Dona branco (du Dão) EMPLACEMENT 7 R3 a-301.305.									
Souche	yeux	début	mi/déb	. Mbre . grap	Ferti- Floraison Véraison lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité				
1	7	1.4	5.41	1					
2	5	253	29 3×	2	2 45 28,5 H-6 19,7 27,7 2.8 30.8 -2 +1 +3				
3	2	16.3	223.	0					
4	5	253	5.4 *	1	Grappe: G - M - P Dim : Compacité: L - M- C Pour: O Mill : O				
5	5	3	5-41	2	Baie: TG - G - M - P Dim:				
		20.5			disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus				
				Ī	Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré				
		G 5.4	93		Saveur: s - m - ar - fox - herb				
		+16			Pépins : avec - apyrène				
	į				Port: Vigueur:				
	1		<u>{</u>						
:	1	4							

N° d'ordre :

Emplacement :

Dona branco (du Dão) 7 R3s.301.305 (4.5)

## (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 1(2) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 160 - sans villosité pubescente 268 - sans villosité laineuse 279.

blanc 101 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jeune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etales - en gouttiere - autres.

Pace inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéouses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse 281.

Tace supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à listré carminé 206 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas cd la promière fouille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

## (I) JEUNES FEUILLES DU BAS

## Facs inférieure

Marvuras : glabre 214 - séteur 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - du mateux 213 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Libro: glabro 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - alvetiux (24) - cotonneux (25) - sans villosité pubescente 2/84 - sans villosité laineuse 285.

A limbo plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

## Pace supérieure

Blanc 226 - Mauve ou roak 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronsées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vorte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux (37) - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laincuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 88

Dona branco (du Dão) 7 R 3 s- 30 1-305 s-5

Désignation : Emplacement :

No d'ordre :

dantadantadartadartad

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 238 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256). Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259

: verte (60) - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 285) Bourgeon

#### ( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo89

idantarkinterduatenduatend

Dona branco (du Dão) 7 R3 s-301-305 s-5

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 162 / grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux (47) - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranteux 153/- duveteux 154/- cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuso 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révolute - tourmenté. Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162) - grossiërement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen 177 - ccurt 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 1(77) - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

-Calvo 89

N° d'ordre : Jona branco (du Jão) 90 Désignation : 7 R30-301.305(5) Emplacement :

### GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 10 (dimensions 12x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 13

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6 faire.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 45 x 15). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 / coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation façile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122/- rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte [25] - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129/ A pinceau : court 130 - moyen [31] - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134, A peau fine 1/35)- moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (39) - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène. - Calvo 90

alantardiminalasisadiratard

Dona branca (du Jaô) bl. 7 R30-301-3054,5

DENOMINATION : EMPLACEMENT

¥4

## SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4) : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - efface(2) : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo89

```
Emplacement: 7 R3 A 301. 305.
                                              : 1 - (2) - 3
Angle des nervures
                                              : 4 - 5 - 6
Sexe
L1/L1
                                              : 7 - 8 - 9
                                             : (10) - 11
L2/L
                                  \begin{array}{c} : 10 - 11 \\ : 12 - (3) - (14) - 15 - 16 \\ : 17 - 18 - (19) - (20) \\ : (21) - (22) - 23 - 24 \\ : 25 - (26) - (27) - 28 - 29 \end{array}
Nombre de lobes
Prof. sinus latéral Sup.
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert
```

N° d'ordre : 2891.01

Désignation: Dona branco du Dão

Sinus pétiolaire ouvert : 267

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents : forme : 40 - 41

Dents (angle) : 42 - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47

Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58-59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62

: 63 - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Largeur du sinus pétiolaire

Remes 92.